



当院でのワクチン接種はすべて予約制となっております
ご希望の方は病院へお問い合わせ下さい。



* 当院では子どもの定期予防接種は行っていません

ワクチン名	不活化/ 生	任意/ 定期	接種回数	備 考	ワクチン任意接種料金 (税込・円)
A型肝炎ワクチン (エイムゲン)	不活化 ワクチン	任意接種	3回	対象者: 全年齢 1回目・2回目の間は2-4週 1回目 - 3回目の間24週あける	1回目
					2回目以降
B型肝炎ワクチン (ビームゲン、ヘパタックスII)	不活化 ワクチン	任意接種	3回	1回目・2回目の間は4週 1回目 - 3回目の間は20 - 24週あける 汚染事故時: 事故発生後7日以内、その後1か月後および3~6か月後	1回目
					2回目以降
肺炎球菌ワクチン PPSV23 (ニューモバックスNP)	不活化 ワクチン	任意接種 定期接種	1回	【定期接種】PPSV23 定期接種対象者: 2023年度末までは、 (1)65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人 (2)60~64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある人で、身体障害者手帳1級をお持ちの人 (1)、(2)の人であって、これまでに、公費・自費に関係なく肺炎球菌ワクチン(23価)を1回も接種したことがない人ただし、1回でも接種したことがある人は、定期接種として受けることができません。	1回目
肺炎球菌ワクチン PCV15 (パクニュバンス)	不活化 ワクチン	任意接種	1回	対象者: 高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者(筋肉内注射)	1回目
破傷風ワクチン (沈傷破傷風トキソイド)	不活化 ワクチン	任意接種	初回2回 追加1回	対象者: 全年齢 初回2回: 3~8週 追加接種は、初回接種後6か月以上(標準12~18か月)の間隔	1回目
					2回目以降
狂犬病ワクチン (ラビビュール筋注用)	不活化 ワクチン	任意接種	3回 4回~6回	対象者: 全年齢 暴露前 3回(0、7、21日又は0、7、28日) 暴露後 4回(0日・接種部位を変えて2か所に1回ずつ計2回、7、21日) 5回(0、3、7、14、28日) 6回(0、3、7、14、30、90日)	1回目
					2回目以降
日本脳炎ワクチン (ジェービックV)	不活化 ワクチン	任意接種 定期接種	3回	初回接種として1~4週間の間隔を置いて2回、 初回接種後おおむね1年を経過した時期に1回追加接種 (当院では定期接種は行っていません)	1回目
					2回目以降
子宮頸がんワクチン(4価) (ガーダシル)	不活化 ワクチン	任意接種 定期接種	3回	任意接種対象者は9歳以上 1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回 定期接種対象者は、12歳になる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子	1回目
					2回目以降
子宮頸がんワクチン(9価) (シルガード9)	不活化 ワクチン	任意接種 定期接種	3回	任意接種対象者は9歳以上 初回接種後2か月後(2回目)、初回接種後6か月後(3回目) * 1回目接種を15歳になるまでに接種する場合は、2回接種(2回目は初回接種後6か月後) 定期接種対象者は、12歳になる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子	1回目
					2回目以降
帯状疱疹ワクチン (シングリックス筋注用)	不活化 ワクチン	任意接種	2回	接種対象: 50歳以上(市町村によっては接種補助制度有) 2か月開けて2回接種	1回目
					2回目以降
水痘ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」)	生ワクチン	任意接種	帯状疱疹1回 水痘 2回	帯状疱疹ワクチンとしての対象: 50歳以上 水痘ワクチンとしての接種の場合1回目と2回目の間は1か月以上あける	1回目
					2回目以降
MRワクチン (麻しん・風疹混合)	生ワクチン	任意接種 定期接種	2回	1回目と2回目の間は1か月以上あける 定期接種対象者: 風しん5期 1962年4月2日から1979年4月1日生まれ男性 接種推奨: 2回の接種歴がない、かつ感染歴がない人	1回目
					2回目以降
麻しん(はしか)ワクチン	生ワクチン	任意接種 定期接種	2回	【風しんワクチン接種助成制度】 ・今までに風しんにかかったことがない、風しんワクチン(麻しん風しん混合ワクチンを含む)を接種したことがない方 ・風しん抗体検査の抗体価が低い方 ・麻しん風しん混合ワクチン・風しんワクチンのいずれかの接種費用を全額を助成(令和2年4月1日~令和3年3月31日)	1回目
風疹ワクチン	生ワクチン	任意接種 定期接種	2回		2回目以降
おたふくかぜワクチン (流行性耳下腺炎・ムンプス)	生ワクチン	任意接種	2回 (推奨)	成人対象者 2回の接種歴がない、かつ感染歴がない人 1回目と2回目の間は1か月以上あける	1回目
					2回目以降